
LIDOCAINE VASELINECREME 3%

1 Werking en toepassingen

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Het werkzame bestanddeel in lidocaïne vaselinecrème is lidocaïne.

Lidocaïne maakt de huid gevoelloos. Het wordt gebruikt bij pijn, branderigheid en jeuk bij aambeien en anusscheurtjes. De vaselinecrème vormt een beschermend laagje op de huid rond de anus, waardoor de irritatie afneemt.

De werking van Lidocaïne vaselinecrème treedt binnen een kwartier in.

2 Bijwerkingen

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn het volgende:

Soms

- Huidirritatie. U merkt dit bijvoorbeeld aan roodheid. Als de lidocaïne is uitgewerkt, kunt u het merken aan meer jeuk of branderigheid. Raadpleeg uw arts als dit aanhoudt.

Zeer zelden

- Overgevoeligheid voor dit medicijn of één van de bestanddelen van dit huidmiddel. Dit merkt u aan galbulten, zwelling, roodheid of jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Blijkt u overgevoelig, geef dat dan aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3 Hoe, wanneer en hoelang?

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Laat dit medicijn niet in uw oog komen. Wrijf niet in uw oog als u dit medicijn met een vinger hebt aangebracht. Gebruik bij voorkeur een vingercondoom, dit is een hoesje dat u over de vinger kunt aanbrengen. Het is verkrijgbaar in de apotheek. Komt het per ongeluk in het oog spoel dan goed met water om het medicijn te verwijderen en raadpleeg direct een arts.

- Jeuk en pijn. Smeer dit medicijn dun op de jeukende of pijnlijke plekken. Smeer het alleen op een intacte huid, dus niet op open plekken en wondjes. Het remt namelijk de genezing van wondjes.
- Aambeien en anusscheurtjes. Maak de anus vooraf schoon, bij voorkeur met een watje olie, om het irriterende vocht te verwijderen. Smeer de crème dun op de huid rond en in de anus. U kunt hiervoor een hoesje voor over de vinger, een vingercondoom, gebruiken. Dit is verkrijgbaar in de apotheek. De tube is ook leverbaar met een canule (tuitje). U kunt de crème dan wat dieper in de anus brengen.

Wanneer?

- Aambeien. Breng de crème 's ochtends en 's avonds aan en na elke ontlasting.
- Anusscheurtjes. Breng de crème 's ochtends en 's avonds aan en zo mogelijk voor elke ontlasting.

Hoelang?

- Jeuk en pijn. Heeft u dit medicijn langer dan 2 weken nodig? Raadpleeg dan uw arts.
- Aambeien en anusscheurtjes. Heeft u na 4 weken nog klachten? Raadpleeg dan uw arts.

4 Dosis vergeten?

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Gebruik het medicijn weer als u het nodig heeft.

5 Autorijden, alcohol, voeding

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

Autorijden en alcohol drinken?

Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?

Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen. Bij aambeien is het wel verstandig te zorgen voor vezelrijke voeding. Dit maakt de ontlasting zachter, zodat u minder hard hoeft te persen. Vezels zitten vooral in volkorenproducten, groenten en fruit.

6 Wisselwerking

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

U kunt dit medicijn veilig gebruiken in combinatie met andere medicijnen.

7 Zwangerschap en borstvoeding

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Borstvoeding

U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Gebruikt u dit middel tegen pijnlijke tepels? Breng het dan aan direct na de voeding en was het voor de volgende voeding weer af, zodat de baby het niet in de mond krijgt.

8 Wanneer niet gebruiken?

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

U mag dit middel niet gebruiken

- Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op lidocaïne of andere middelen die hierop lijken.
- Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op methylparahydroxybenzoesuur en/of propylparahydroxybenzoesuur (conserveermiddelen) of stoffen die hierop lijken (= parabenen).

Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Bijwerkingen' en 'Zwangerschap en borstvoeding'.

9 Stoppen

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.

10 Samenstelling

Wat zit er in dit medicijn?

Lidocaïne vaselinecrème 3% bevat per gram 30 mg lidocaïne en als conserveermiddel propyleenglycol. Verder bevat de crème cetomacrogolwas, vloeibare paraffine en witte vaseline.

11 Bewaren

Hoe moet ik het medicijn bewaren?

Bewaar de crème beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer. Sluit tube na gebruik goed af, dit voorkomt bederf.

In een onaangebroken verpakking is de crème houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat. Na aanbreken van de verpakking is de crème maximaal 12 maanden houdbaar, maar niet langer dan de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat.

Als u nog vragen heeft kunt u terecht bij uw apotheker.

12 Overige informatie

Deze informatie is bedoeld om u op eenvoudige wijze globaal inzicht te verschaffen in de voorgeschreven medicatie. De tekst is niet bedoeld volledig te zijn en u kunt er geen rechten aan ontleen.

Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluitertekst of kunt u informatie inwinnen bij de ziekenhuisapotheek. Het is belangrijk om problemen bij gebruik van dit geneesmiddel te melden aan uw arts of verpleegkundige. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen.

Voor meer vragen over dit geneesmiddel kunt u contact (laten) opnemen met de ziekenhuisapotheek. Telefoon: 0478-509200, fax: 0478-509215, e-mail: info@broceefziekenhuisfarmacie.nl