
DILTIAZEM VASELINECETOMACROGOLCREME 2%

1 Werking en toepassingen

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

De werkzame stof in diltiazem vaselinecetomacrogolcrème is diltiazem.

Diltiazem behoort tot de calciumblokkers.

Artsen schrijven een crème met diltiazem voor bij anusscheurtjes.

Anusscheurtjes zijn scheurtjes in het slijmvlies van de anus. De scheurtjes worden in de meeste gevallen door (dikke) harde ontlasting veroorzaakt, maar ze kunnen ook ontstaan bij seksueel contact via de anus. Anusscheurtjes kunnen klachten geven van pijn bij en na ontlasting, jeuk, branderig gevoel en licht bloedverlies. Als daardoor de ontlasting wordt opgehouden, worden de klachten alleen maar erger. De ontlasting wordt harder waardoor de scheurtjes steeds open scheuren en meer pijn veroorzaken.

Diltiazem verslapt de spanning op de spieren in de anus en vermindert daardoor de druk op de fissuur. Ook verwijdt het de bloedvaten in de anus en verbetert zodoende de bloedvoorziening op de plaats van de kloof. Hierdoor kan het beter genezen. De werking duurt na aanbrengen ongeveer twaalf uur.

De pijn wordt meestal pas na twee weken minder. Het kan zes weken tot drie maanden duren voordat de anale fissuur helemaal genezen is.

2 Bijwerkingen

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn lichte irritatie van de huid rond de anus, hoofdpijn, duizeligheid en overgevoeligheid.

Soms

- Lichte irritatie van de huid rond de anus. Vraag advies aan uw arts als u hier veel last van heeft.

Zeer zelden

- Hoofdpijn en duizeligheid. Dit gaat vanzelf over als u gewend bent aan het medicijn.
- Overgevoeligheid. Dit merkt u aan een verergering van klachten, zoals jeuk. Raadpleeg uw arts als u overgevoeligheid vermoedt. Blijkt u overgevoelig, geef dat dan aan de apotheker door. Het apothekerteam kan er op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3 Hoe, wanneer en hoelang?

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

- Druk ongeveer 2 cm crème uit de tube en smeer dit op het anusscheurtje en op de huid rond en in de anus.

- Was de vinger waarmee u het middel heeft aangebracht daarna met wat zeep. Ook kunt u voor het aanbrengen plastic handschoenen of een 'vingercondoom' gebruiken. Dit is een hoesje dat u over de vinger aanbrengt. Het is te krijgen in uw apotheek.

Wanneer?

Breng de crème 's ochtends en 's avonds aan.

Hoelang?

Gebruik dit medicijn totdat het anusscheurtje is genezen. Dit kan zes weken tot drie maanden duren.

4 Dosis vergeten?

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Een keer vergeten is niet zo erg. Probeer zo veel mogelijk uw normale schema te volgen, dan heeft u sneller resultaat. Een dubbele hoeveelheid smeren, heeft geen zin.

Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

5 Autorijden, alcohol, voeding

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...**Autorijden?**

Voor dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Alcohol drinken?

Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als dit medicijn. U kunt daardoor eerder last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

Alles eten?

Voor dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

6 Wisselwerking

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

- Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. De hoeveelheid diltiazem in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

7 Zwangerschap en borstvoeding

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?**Zwangerschap**

Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Ook mannen van wie de partner binnenkort zwanger wil worden, kunnen dit medicijn beter niet gebruiken. Mannen die dit medicijn gebruiken, kunnen namelijk minder vruchtbaar zijn. Overleg hierover met uw arts. Misschien kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

8 Wanneer niet gebruiken?

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

U mag dit middel niet gebruiken

- Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op diltiazem.

Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Bijwerkingen' en 'Zwangerschap en borstvoeding'.

9 Stoppen

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.

10 Samenstelling

Wat zit er in dit medicijn?

Diltiazem vaselinecetomacrogolcrème 2% bevat per gram 20 mg diltiazemhydrochloride en als conserveermiddel propyleenglycol. Verder bevat de crème cetomacrogolwas, vloeibare paraffine en witte vaseline.

11 Bewaren

Hoe moet ik het medicijn bewaren?

Bewaar de crème beneden 25 °C, niet in de vriezer. Sluit de tube na gebruik goed af. Dit voorkomt uitdroging en bederf.

In een onaanbroken verpakking is de crème houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat. Na aanbreken van de verpakking is de crème maximaal 6 maanden houdbaar, maar niet langer dan de uiterste gebruikstermijn die op de verpakking staat.

Als u nog vragen heeft kunt u terecht bij uw apotheker.

12 Overige informatie

Deze informatie is bedoeld om u op eenvoudige wijze globaal inzicht te verschaffen in de voorgeschreven medicatie. De tekst is niet bedoeld volledig te zijn en u kunt er geen rechten aan ontleen.

Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluitertekst of kunt u informatie inwinnen bij de ziekenhuisapotheek. Het is belangrijk om problemen bij gebruik van dit geneesmiddel te melden aan uw arts of verpleegkundige. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen.

Voor meer vragen over dit geneesmiddel kunt u contact (laten) opnemen met de ziekenhuisapotheek. Telefoon: 0478-509200, fax: 0478-509215, e-mail: info@brocacefziekenhuisfarmacie.nl