
TRANEXAMINEZUUR MONDSPOELING

1 Werking en toepassingen

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

De werkzame stof in tranexaminezuur mondspoeling is tranexaminezuur.

Tranexaminezuur wordt na een tandheelkundige ingreep gebruikt bij mensen die antistollingsmiddelen krijgen. Door de ingreep kan een wond ontstaan. Door de antistollingsmiddelen kan de wond opnieuw gaan bloeden. Tranexaminezuur houdt een bloedstolsel op een vaatbeschadiging in stand, waardoor de wond niet opnieuw kan gaan bloeden.

2 Bijwerkingen

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve de gewenste werking kan dit middel ook bijwerkingen geven. Deze bijwerkingen treden minder vaak op bij de mondspoeling.

Zelden

- Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree.

Zeer zelden

- Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk en roodheid. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor tranexaminezuur. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
- Trombose (bloedstolsel in de vaten). Het effect van tranexaminezuur kan doorslaan, waardoor op andere plekken een bloedstolsel kan ontstaan. Vooral bedlegerige patiënten hebben hier zeer zelden kans op. Dit is de reden dat mensen die al last hebben van trombose het vaak niet mogen gebruiken. In sommige gevallen kan het worden gecombineerd met een antistollingsmiddel, zoals heparine.
- Duizeligheid.
- Veranderingen in het zien, zoals kleurenblindheid. Waarschuw uw arts als u dit merkt. Deze bijwerking verdwijnt meestal weer als u stopt met het middel.
- Aanval met spierschokken en spierkrampen. Neem direct contact op met een arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3 Hoe, wanneer en hoelang?

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

- Meet met de maatbeker de voorgeschreven hoeveelheid af. Spoel hiermee twee minuten lang de mond. Slik de vloeistof niet door.

Wanneer?

- U moet na de ingreep starten met de mondspoeling.

Hoelang?

- Na de ingreep de mondspoeling twee tot vijf dagen gebruiken.
- Wanneer dit middel niet helpt, vraag dan advies aan uw arts.

4 Dosis vergeten?

Wat moet ik doen als ik als ik een dosis ben vergeten?

Als u dit middel 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan één uur voor u de volgende dosis normaal gebruikt? Gebruik de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan een uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

5 Autorijden, alcohol, voeding

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

Autorijden, alcohol drinken en alles eten?

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

6 Wisselwerking

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

U kunt dit middel veilig gebruiken in combinatie met andere medicijnen.

7 Zwangerschap en borstvoeding

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. Laat daarom uw arts weten dat u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden.

Borstvoeding

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is.

8 Wanneer niet gebruiken?

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

U mag dit middel niet gebruiken

- Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op tranexaminezuur.
- Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op methylparahydroxybenzoaat (conserveermiddel) of stoffen die hierop lijken (= parabenen).
- Wanneer u trombose heeft.

Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Bijwerkingen' en 'Zwangerschap en borstvoeding'.

9 Stoppen

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

10 Samenstelling

Wat zit er in dit medicijn?

Tranexaminezuur mondspoeling 50 mg/ml bevat per ml (= milliliter) 50 mg tranexaminezuur en als conserveermiddel methylparahydroxybenzoaat. Verder bevat de mondspoeling citroenzuur-monohydraat, propyleenglycol en sorbitol.

11 Bewaren

Hoe moet ik dit medicijn bewaren?

Bewaar de mondspoeling beneden 25 °C, niet in de vriezer. Sluit na gebruik de fles goed af. Dit voorkomt uitdroging en bederf.

In een onaangebroken verpakking is de mondspoeling houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat. Na aanbreken van de verpakking is de mondspoeling maximaal 6 maanden houdbaar, maar niet langer dan de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat. U kunt op de verpakking noteren wanneer u deze heeft geopend.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker.

12 Overige informatie

Deze informatie is bedoeld om u op eenvoudige wijze globaal inzicht te verschaffen in de voorgeschreven medicatie. De tekst is niet bedoeld volledig te zijn en u kunt er geen rechten aan ontleen.

Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluitertekst of kunt u informatie inwinnen bij de ziekenhuisapotheek. Het is belangrijk om problemen bij gebruik van dit geneesmiddel te melden aan uw arts of verpleegkundige. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen. Voor meer vragen over dit geneesmiddel kunt u contact (laten) opnemen met de ziekenhuisapotheek. Telefoon: 0478-509200, fax: 0478-509215, e-mail: info@broceafziekenhuisfarmacie.nl