
DITRANOL 3% / SALICYLZUURCOLLODIUM 25% FNA

1 Werking en toepassingen

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Ditranol remt de groei van huidcellen af, waardoor het de groei van wratten remt. Salicylzuur werkt in op de hoornlaag van de huid. De hoornlaag is het bovenste laagje van de huid. Salicylzuur weekt dit laagje van de huid los en bevordert een normale groei van de huid.

Artsen schrijven deze combinatie voor bij wratten.

Wratten

Wratten zijn vergroeiingen van de huid, die ontstaan door besmetting met een virus. Het zijn meestal huidkleurige bobbel met een doorsnede van een millimeter tot een centimeter, met een ruw oppervlak. Ze komen vooral voor op de handen, voetzolen, knieën en in het gezicht. Door aanraking kunt u anderen besmetten.

Wratten komen het meest voor bij jonge mensen, voornamelijk schoolgaande kinderen. Bij volwassenen komen wratten nauwelijks voor, omdat ze in het algemeen immuun zijn geworden voor het virus dat de wratten veroorzaakt.

Meestal verdwijnen wratten na een aantal jaren vanzelf. Zitten ze echter op een vervelende of opvallende plek, dan is het aan te raden ze te laten verwijderen of te behandelen met een wrattenmiddel.

Uw arts kan ditranol/salicylzuur collodium in sommige gevallen voorschrijven bij wratten. Ditranol remt de groei van de huidcellen af, waardoor de wrat niet verder groeit. Salicylzuur verweekt de eeltlaag, zodat de wrat makkelijker is te verwijderen.

Raadpleeg uw huisarts als u van een wrat af wilt die zich op een vochtige plek bevindt, zoals in de mondhoeken, bij schaamlippen, penis of anus.

2 Bijwerkingen

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

- Paarsbruine verkleuring van de plek die u aanstipt, maar ook huid, kleding, handdoeken, beddengoed, tegels en sanitair als hier aanstipvloeistof op terecht komt. De verkleuring van de huid verdwijnt meestal na 1 tot 2 weken vanzelf. De vlekken in textiel zijn niet te verwijderen. Vlekken in sanitair kunt u verwijderen door direct na het afwassen het sanitair schoon te maken met een zacht schuurmiddel.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

- Droge huid en irritatie van de behandelde plekken en de omringende huid. Dit uit zich in een brandend en stekend gevoel, roodheid en soms jeukende uitslag. Neem contact op met uw arts, wanneer u last blijft houden van huidirritatie.
- Pijn, doordat de wrat verhardt, wat bij aanraking of stoten pijnlijk is. De wrat kan ook breken.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

- U kunt de gezonde huid beschadigen als het middel er op komt. Bescherm daarom de gezonde huid, door op de gezonde huid rond de wrat een beetje vaseline te smeren.
- Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg uw arts als u last heeft van deze verschijnselen. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor ditranol/salicylzuur collodium. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb (www.lareb.nl). Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld.

3 Hoe, wanneer en hoelang?

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Gebruik dit middel niet in het gezicht of bij wondjes. Laat het middel niet in het oog of op de oogleden komen. Dit kan beschadigingen geven. Komt het per ongeluk in het oog, de neus, mond of een wondje, spoel dan goed met water om het middel te verwijderen.

- Week de wrat zo mogelijk vijf minuten in warm water en droog daarna goed af.
- Dek de omliggende huid eventueel af met een beetje vaseline, om de gezonde huid tegen irritatie te beschermen.
- Bedek de wrat met een paar druppels aanstipvloeistof met een penseeltje of wattenstaafje en laat de vloeistof opdrogen.
- Plak na het aanstippen de wrat eventueel af met een stukje pleister of tape.
- Brengt u de aanstipvloeistof op de handen aan? Pas dan op dat u niet in de ogen wrijft, want slechts een klein beetje aanstipvloeistof kan de oogleden erg irriteren.
- Sluit het flesje goed af, om verdampen van de inhoud te voorkomen. Het is kort houdbaar. Kijk op het etiket voor de uiterste gebruiksdatum.
- Dit middel is brandbaar. Pas daarom op met gebruik in de nabijheid van open vuur, zoals de geiser.
- Let op: dit middel maakt paarsbruine vlekken op onder andere kleding en beddegoed.

Wanneer?

Gebruik de aanstipvloeistof eenmaal per dag, bijvoorbeeld 's avonds. Als de plek door de behandeling erg pijnlijk wordt, kunt u één of twee dagen overslaan.

Hoelang?

Ga door tot de wrat helemaal weg is. Meestal is dat na enkele weken, soms moet u de behandeling herhalen. Een enkele keer kan het enkele maanden duren voor de wrat weg is.

4 Dosis vergeten?

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Een keer vergeten is niet zo erg. Probeer zo veel mogelijk uw normale schema te volgen, dan heeft u sneller resultaat.

5 Autorijden, alcohol, voeding

autorijden, alcohol drinken en alles eten?

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

6 Mag ik ditranol met salicylzuur op de huid gebruiken met andere medicijnen?

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

7 Zwangerschap en borstvoeding

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

Borstvoeding

Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

8 Wanneer niet gebruiken?

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

U mag dit middel niet gebruiken

- Overgevoeligheid voor ditranol en/of salicylzuur.
- Bij erythrodermatische of pustuleuze psoriasis
- Bij gebruik op ontstoken of beschadigde huid.

Toepassing op tere huidgedeelten, zoals in het gezicht, op genitaliën of in lichaamsplooiën, wordt ontraden vanwege de irriterende eigenschappen van ditranol.

Contact met ogen en slijmvlies dient te worden vermeden.

Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Bijwerkingen' en 'Zwangerschap en borstvoeding'.

9 Stoppen

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

10 Samenstelling

Wat zit er in dit medicijn?

Ditranol 3% / salicylzuurcollodium 25% bevat ditranol, salicylzuur, tocoferol (dl-alfa), ricinusolie, collodium 4% w/v en aceton.

11 Bewaren

Hoe moet ik dit medicijn bewaren?

Bewaar de collodium beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer. Sluit het flesje na gebruik goed af.

Ditranol 3% / salicylzuurcollodium 25% is kort houdbaar. Niet langer dan aangegeven houdbaarheidsdatum gebruiken.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker.

12 Overige informatie

Deze informatie is bedoeld om u op eenvoudige wijze globaal inzicht te verschaffen in de voorgeschreven medicatie. De tekst is niet bedoeld volledig te zijn en u kunt er geen rechten aan ontleen.

Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluitertekst of kunt u informatie inwinnen bij de ziekenhuisapotheek. Het is belangrijk om problemen bij gebruik van dit geneesmiddel te melden aan uw arts of verpleegkundige. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen.

Voor meer vragen over dit geneesmiddel kunt u contact (laten) opnemen met de ziekenhuisapotheek.

Telefoon: 0478-509200, fax: 0478-509215, e-mail: info@brocacefziekenhuisfarmacie.nl