

## LIDOCAINE HCL ORALE GEL

### 1 Werking en toepassingen

#### Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

De werkzame stof in Lidocaïne HCl orale gel is lidocaïne hydrochloride.

Lidocaïne HCl orale gel maakt slijmvliesen plaatselijk gevoelloos en verlicht pijn. Het wordt gebruikt bij pijnlijke aandoeningen in de keel of slokdarm. Het wordt ook gebruikt bij een scopie en het inbrengen van een sonde.

De werking begint na enkele minuten en houdt ongeveer een kwartier tot een half uur aan na innemen/doorslikken van de gel.

### 2 Bijwerkingen

#### Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel soms bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn wondjes in de mond, irritatie en overgevoeligheid.

#### Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

- Wondjes door per ongeluk bijten op de verdoofde wang of tong. Dit kan met name gebeuren als een groot deel van de mondholte met de drank is verdoofd. Door gedurende een uur na gebruik hiervan niet te eten kunt u deze bijtwondjes vermijden.
- Irritatie van de slijmvliesen. Raadpleeg uw arts als dit aanhoudt.

#### Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

- Overgevoeligheid. Dit merkt u aan zwelling in de mond, roodheid of jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor lidocaïne. Het apotheekteam kan er op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Laat uw arts dit melden aan het bijwerkingencentrum lareb ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Laat uw arts dit tevens doorgeven aan Brocacef Ziekenhuisfarmacie (e-mail:[farmacovigilantie@b-zf.nl](mailto:farmacovigilantie@b-zf.nl))

### 3 Hoe, wanneer en hoelang?

#### Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

#### Hoe?

Bij pijn in de keel of slokdarm: slik de drank langzaam door. Na het doorslikken kunt u het best één uur wachten met eten en drinken.

#### Wanneer?

- Pijnlijke plekken in keel of slokdarm: voor een continu effect de doses zo goed mogelijk over dag verdelen. Gebruikt u dit middel om het eten minder pijnlijk te maken? Breng het dan direct voor het eten aan.
- Voorafgaand aan onderzoek of plaatsen van een sonde: uw arts of verpleegkundige vertelt u hoe lang van te voren u de orale gel moet gebruiken.

## 4 Dosis vergeten?

### Wat moet ik doen als ik als ik een dosis ben vergeten?

- Pijnlijke plekken in keel of slokdarm: breng het middel dan gewoon aan.
- Voorafgaand aan onderzoek of plaatsen van een sonde: als er nog voldoende tijd is voordat de ingreep plaatsvindt, kunt u de orale gel alsnog gebruiken.

Wanneer u te veel heeft gebruikt, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

## 5 Autorijden, alcohol, voeding

### Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

#### Autorijden?

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

#### Alles eten en alcohol drinken?

- Indien u de orale gel doorslikt, kunt u beter niet eten of drinken voordat de verdoving is uitgewerkt. U kunt zich anders verslikken of op uw wang of tong bijten.

## 6 Wisselwerking

### Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

U kunt dit middel veilig gebruiken in combinatie met andere medicijnen.

## 7 Zwangerschap en borstvoeding

### Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

#### Zwangerschap

U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind.

#### Borstvoeding

Bij een kortdurend gebruik van één of enkele dagen kunt u dit middel veilig gebruiken. Het komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Bij een beperkt gebruik zal het kind daar geen last van hebben.

## 8 Wanneer niet gebruiken?

### Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

U mag dit middel niet gebruiken

- Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op lidocaïne of middelen die hierop lijken.
- Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op methylparahydroxybenzoesaat en/of propylparahydroxybenzoesaat (conserveermiddelen) of stoffen die hierop lijken (parabenen).
- Wanneer u porfyrie heeft.

Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Bijwerkingen' en 'Zwangerschap en borstvoeding'.

## 9 Stoppen

### Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Ja, u kunt op elk moment in één keer met het gebruik stoppen.

## 10 Samenstelling

### Wat zit er in dit medicijn?

Lidocaïne HCl orale gel 20 mg/ml bevat per ml (= milliliter) 20 mg lidocaïnehydrochloride. De gel bevat als conserveermiddel methylparahydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat. Verder bevat de gel glycerol, hypromellose, natriummonowaterstoffsfaat-dodecahydraat, pepermuntolie en saccharine natrium.

## 11 Bewaren

### Hoe moet ik dit medicijn bewaren?

Bewaar de gel beneden 25°C, niet in de vriezer. Sluit de fles na gebruik goed af, dit voorkomt bederf. Onaangeboden is de gel houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat. Na aanbreken van de verpakking is de gel maximaal 6 maanden houdbaar.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker.

## 12 Overige informatie

Deze informatie is bedoeld om u op eenvoudige wijze globaal inzicht te verschaffen in de voorgeschreven medicatie. De tekst is niet bedoeld volledig te zijn en u kunt er geen rechten aan ontlenen.

Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluitertekst of kunt u informatie inwinnen bij de ziekenhuisapotheek. Het is belangrijk om problemen bij gebruik van dit geneesmiddel te melden aan uw arts of verpleegkundige. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen.

Voor meer vragen over dit geneesmiddel kunt u contact (laten) opnemen met de ziekenhuisapotheek. Telefoon: 0478-509245, e-mail: [bereidingen@b-zf.nl](mailto:bereidingen@b-zf.nl)